

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと



### 製品特徴

1. 便が出口で固くなって出づらい方、楽に排便したい方のための便秘薬です
2. 便に水分を与えてやわらかくするDSS※1（水分浸透成分）と、生薬由来のオイル成分※で、出口で固まった便までつるんと出します

※1 DSSとは、ジオクチルソジウムスルホサクシネートです  
※オイル成分とは、天然の生薬 麻子仁(マシニン)末に含まれる成分です

販売名：オイルデル

便秘薬 第2類医薬品

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬(下剤)

#### 🗨️ 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

##### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢

##### 4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

## 効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：  
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

## 用法・用量

次の量を朝夕の空腹時に水又はお湯で服用してください  
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量  
又は減量してください

年齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	3～4カプセル	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

- 空腹時の目安：食後なるべく2時間以上

## 成分・分量

8カプセル中

ジオクチルソジウムスルホサクシネート 200mg、麻子仁末 1000mg

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、プロピレングリコール脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、黄色5号を含有する

- 本剤は天然物（生薬）を用いているため、カプセルの色が多少異なることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

<カプセルの取り出し方>

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる）



### ●服用アドバイス●

初めての方は最小量（3カプセル）から服用してください  
朝夕の空腹時に1日2回服用すれば、1～3日位で自然に近い  
穏やかな効果があらわれます（個人差があります）

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室  
**0120-5884-01**  
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3