

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要
なときに読めるよう本剤とともに保管してください。



解熱鎮痛薬

セデリン®K

第②類医薬品

セデリン®Kは、鎮痛作用のあるアセトアミノフェン、エテンザミドを主成分とし、さらに鎮静作用のあるアリルイソプロピルアセチル尿素や主薬の作用を補助する生薬のカンゾウ、シャクヤク、ケイヒを配合した解熱鎮痛薬です。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

- 頭痛・歯痛・月経痛（生理痛）・神経痛・打撲痛・外傷痛・肩こり痛・筋肉痛・耳痛・腰痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

■用法・用量

次の量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1包	2回まで
11歳以上15歳未満	2／3包	
7歳以上11歳未満	1／2包	
7歳未満	服用しないこと	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

2包（大人1日最大量）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	600mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
エテンザミド	1000mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
カンゾウエキス末 （カンゾウ700mgに相当）	100mg	炎症をおさえ、痛みをしずめます。
シヤクヤク乾燥エキス （シヤクヤク560mgに相当）	80mg	痛みをおさえ、炎症をしずめます。
ケイヒ末	350mg	痛みや熱をおさえる働きを助けます。
アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg	痛みをおさえる働きを助けます。
無水カフェイン	120mg	頭痛をやわらげます。

添加物としてカルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、還元麦芽糖水アメを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割服用した残りは、袋の口を折って湿気の少ない涼しい所に保管し、なるべく早く服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■その他

本剤は生薬成分及び生薬抽出成分を配合していますので、製品により顆粒の色が多少異なる場合がありますが、薬効にかわりはありません。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **日 野 薬 品 工 業 株 式 会 社**

滋 賀 県 蒲 生 郡 日 野 町 上 野 田 1 1 9

S1311H