

C+MEDI

二日酔のむかつき・
胃もたれ・
食欲不振

15歳以上

1回1本 1日2回 30mL

ストック
胃腸内服液

第3類医薬品

胃腸内服液

ストック胃腸内服液

△
(使用上の注意)

△
(相談すること)

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2.2週間連続服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】18回(30mL×2回)中
ウコン流エキス 0.4mL(ウコンとして
400mg)、カンゾウエキス 150mg
(カンゾウとして600mg)、ニンジンエキス
63mg(ニンジンとして699.3mg)、
チンピエキス 140mg(チンピとして
700mg)、シソチンコ流エキス 0.4mL
(シソチンコとして400mg)、ソウジ
ツ流エキス 0.48mL(ソウジツとして
480mg)、カルニチン塩化糖 120mg
液剤としてセサフレキサス、ルッパ油、
L-メントール、ホピトン、ポリオキシエ
チレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート
80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、
安息香酸Na、白糖、プロピレングリ
コール、香料を含有します。

【効能・効果】
食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部
膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ
(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、
もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はき
け(むかつき、胃のむかつき、二日
酔・悪酔のむかつき、悪気、悪心)、
嘔吐。

【用法・用量】
成人(15歳以上)1回1本(30mL)
を1日2回服用してください。な
お、服用期間は、4週間以上おいて
ください。15歳未満は服用しない
でください。

【用法・用量に関連する注意】
用法・用量を厳守すること
●保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらな
い涼風の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の
届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えない
こと(使用の要因になったり品質が変わる。)。 (4)表示の
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生
じることがあります。よく振ってから服用してください。

ガラス：ビン
金 属：キャップ

製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市杵めが丘7-5-5

製造番号
04STELCO

使用期限

MADE IN JAPAN

04STELCO

使用期限

4 987307 120197