

ティパップ A <ホット>

第3類医薬品

【特徴】

- ティパップA(ホット)は、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった温感パッピング剤です。
- ティパップA(ホット)は、患部に心地よい温感刺激を与えるトウガラシエキスを配合していますので、腰痛、肩こり、関節痛などに効果を發揮します。
- ティパップA(ホット)は、粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性のある基布を使用していますのではがれやすい部位にもピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)打撲(うちみ)、捻挫(ねんざ)には、はがれひいてから使用してください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程度から使用してください。)
- (7)本剤に触れた手で、目の周囲、口腔、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (8)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】

本品膏体100g(700cm²)中 サリチル酸メチル 1.5g トウガラシエキス 0.2g

dL-カンフル 1.0g (原生薬換算量 2.5g)

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管してください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 5枚入 (1枚: 10cm×14cm)

<お問い合わせ先> 帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



申
報
機
關

使
用
期
限
(年)
(月)
(日)