

新ジャストポイント

第3類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹・かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤・かゆみ |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号

使用期限
(西暦年月)

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

プラスチックフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】 本品 1m² (膏体 120g) 中

サリチル酸グリコール · · · · · 6.0 g
l-メントール · · · · · 6.0 g
トコフェロール酢酸エステル · · · · · 2.4 g
添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンプロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、オレイルアルコール、BHT、流動パラフィンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 10枚入(1枚 7cm×10cm)

発売元

ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地
製造販売元



帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931