

肩こり・腰痛・筋肉痛

コンブラック液DX

第3類医薬品

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬

特徴

○つらい肩こり、腰痛に

サリチル酸グリコール(抗炎症成分)、ニコチン酸ベンジルエステル(血行促進成分)、ノナン酸バニリルアミド(血行促進成分)等の配合により、つらい肩こり、腰痛、筋肉痛等の原因となる炎症や痛みをやわらげます。

○安全性

今まで人前でニオイが気になっていた人や、ニオイに敏感な人でも安心して使用できます。

○デカヘッドの塗りやすいボトル

塗布部(スポンジ)が約1.5倍(当社従来品比)に大きくなり、広い範囲に簡単に塗布できます。また、首の部分が曲がっている模型ボトルで、背中や腰などの塗りにくい患部にも、スムーズにむらなく適量を塗布できます。

○I-メントール2倍(当社従来品比)配合

清涼成分であるI-メントールを従来品の3%から6%に増量しました。

使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み


3.5〜6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついでの手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用は避けてください。
- (7) 入浴等で肌をこすったり、汗をかいた時は、本剤による刺激を強く感じる場合があります。激しい痛み又は刺激感やかゆみを感じた場合には、使用を中止し、こすらないでやさしくなでるように塗布部をよく泡だてた石けんと水で数回洗った後、塗布部を冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- (8) 塗布した患部をコタツや電気毛布で温めないでください。
- (9) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (10) 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (11) スポンジ面をゆっくり患部に押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用する、スポンジが破損する場合があります。また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。



製造販売元

ジャパンメテック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口：☎076-438-1107

受付時間 月～金(祝祭日・年末年始を除く) 9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

コンブラック液
DX

大容量
110mL

肩こり 腰痛 筋肉痛

清涼成分UP^{当社}
I-メントール6%配合



血行を促進して
「コリ」を解消

第3類医薬品

【成分・分量】(100g中)

サリチル酸グリコール……………3.0g
I-メントール……………6.0g
クロルフェニルマリン酸塩……………0.1g
ニコチン酸ベンジルエステル……………0.02g
ノナン酸バニリルアミド……………0.012g
添加物：プロピレングリコール、エタノール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物

【効能・効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分に涼しめて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。横に倒して保管したり、キャップがしっかりしまっていないと、まれに薬液がもれ出す場合がありますのでご注意ください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わることがあります)
- (4) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のある床、家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ
(エタノール) 110mL



4 956622 106766