

第3類医薬品

鎮痛・消炎外用貼付剤

ご使用に際して、裏面の説明書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

エルペナEG

10枚入(1枚:7cm×10cm)

＜お問い合わせ先＞ 帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話(0879)25-2363 受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元 帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



切
り
取
り
線

肩こり・腰痛などに エルペナEG

第3類医薬品

【特徴】

- エルペナEGは、鎮痛・消炎作用を有するサリチル酸グリコール、*l*-メントールに、患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステル、ノニル酸ワニリルアミドを配合した、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめをあらわすテープ剤です。
- エルペナEGは、粘着性にすぐれており、関節部位にもピッタリフィットします。

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】ライナー(はくり紙)をはがし、1日1～2回患部に貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】本品1m²(膏体100g)中

サリチル酸グリコール.....8.0g
l-メントール.....5.0g
 トコフェロール酢酸エステル.....0.5g
 ノニル酸ワニリルアミド.....0.01g
 添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHTを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造番号

使用期限
(西暦年月)

