

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# しょう とう とう 消 毒 湯

（生薬製剤）

- ◆「消毒湯」は晝紋症、湿疹の掻痒を改善するために、13種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 次の症状のある人。 むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
6. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

晝紋症<sup>※)</sup>、湿疹の掻痒

※)「晝紋症」とは、皮膚紋画<sup>ひらもんがしやう</sup>症を示します。

## 用法・用量

本品1包を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水550mL(約3合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1日分の1/3量	3回
7歳以上15歳以下	成人の1/2量	
7歳未満	服用しないこと	

食間とは…  
食後2~3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本品1包(25g)中、下記生薬を含有します。

カンゾウ ----- 1.0g    ソウジュツ ----- 2.0g    セッコウ ----- 2.0g  
チモ ----- 2.0g    トウキ ----- 2.0g    シオウ ----- 2.0g  
クジン ----- 2.0g    モクツウ ----- 2.0g    ボウフウ ----- 2.0g  
ケイガイ ----- 2.0g    センタイ ----- 2.0g    ゴマ ----- 2.0g  
ゴボウシ ----- 2.0g

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載されています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電話      03-3843-3833  
受付時間   9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7