

鎮痛・消炎外用薬

ご使用に際して、裏面の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【特 徴】

第3類医薬品

- ムフロンプップは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感パップ剤です。
- ムフロンプップは、炎症や痛みなどに効果のあるサリチル酸メチル、L-メントールなどの働きで、打撲、捻挫などにすぐれた効き目を発揮します。
- ムフロンプップは、粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性のある基布を使用していますので、関節部位にもピッタリフィットします。

やわらぎ<クール>

6枚入
(10cm×14cm)



大阪府柔道整復師協同組合

ムフロンプップ

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、関節痛、肩こり、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】 本品膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸メチル……………0.5g l-メントール……………0.3g

dl-カンフル……………0.5g トコフェロール酢酸エステル……0.1g

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリソルベート80、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光に当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



＜お問い合わせ先＞

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879)25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

貯
庫
過
期

限
期
使
用
(西暦年)