

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# 新エスタックエース顆粒

第②類医薬品

かぜ薬 葛根湯加桔梗エキス配合 のみやすく、溶けやすい顆粒タイプ

●新エスタックエース顆粒は、かぜの諸症状に有効な洋薬成分と、古くから「かぜ」に用いられてきた葛根湯に桔梗を加えた「葛根湯加桔梗(かっこんとうかきょう)エキス」を配合したかぜ薬で、さむけ(悪寒)、頭痛、くしゃみ、鼻水などの症状によく効きます。

●新エスタックエース顆粒は、のみやすく、溶けやすい顆粒タイプです。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### ① 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)12才未満の小児。

#### ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)

#### ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

#### ④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### ⑤ 服用前後は飲酒しないでください

#### ⑥ 長期連用しないでください



### 相談すること

#### ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症、フェニルケトン尿症

#### ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症状          |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |

| 関係部位 | 症状      |
|------|---------|
| 泌尿器  | 排尿困難    |
| その他  | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症状   |
|---|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症候群  | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。                                |

| 症状の名称   | 症状   |
|---------|--|
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腎障害     | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。                    |
| 間質性肺炎   | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく    | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                  |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。  |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。  |
| 呼吸抑制    | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。   |

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便祕、口のかわき、眠気
- ④ 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年 齡 | 成人(15才以上) | 12才~14才 | 12才未満    |
|-----|-----------|---------|----------|
| 1回量 | 1包        | 2/3包    | ×服用しないこと |

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分  
1包(2.0g)中

|  |  |
|--|--|
| 葛根湯加桔梗エキス…1,000mg<br>〔カッコン0.53g、マオウ0.27g、ケイヒ0.2g、シャクヤク0.2g、<br>タイソウ0.27g、ショウキョウ0.07g、カンゾウ0.13g、キョウウ<br>0.27gの煎液より製したエキス〕 | アセトアミノフェン……………240mg<br>ジビドロコデインリン酸塩……………5mg<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩…2.5mg<br>無水カフェイン……………25mg |
|--|--|

添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、ゼラチン、乳糖、白糖、デンプン、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バニリン、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)  
(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元  
**エスエス製薬株式会社**  
〒163-1488 東京都新宿区西新宿3-20-2