

ビタミンC主薬製剤

第3類医薬品 販売名：ビタミンC錠オール

ご使用の前に、この外箱を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

〔特徴〕

リボフラビン酸エステル(ビタミンB₂)を配合したビタミンC主薬製剤です。
6錠(15歳以上の1日最大服用量)中にビタミンC2000mgを含みます。

△ 使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3.1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**

〒661-0953

兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地

本品に関するお問い合わせ

くすり相談室 TEL(06)6491-6222

電話受付時間：月～金(祝日を除く)

9:00～17:00




箱

第3類医薬品

しみ、そばかす 日焼けによる色素沈着



1日6錠で
2000mg



55日分
330錠

〔成分・分量〕

ビタミンC錠オールは黄色の錠剤で、1日量(6錠)中に次の成分を配合しています。

アスコルビン酸末 …………… 1,030.93mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC)として… 1,000mg〕
L-アスコルビン酸ナトリウム …………… 1,124.79mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC)として… 1,000mg〕
リボフラビン酸エステル(ビタミンB₂酸エステル)・6.00mg

添加物として、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポドン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

〔用法・用量〕

下記の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2 回
11歳以上 15歳未満	1～2錠	
7歳以上 11歳未満	1 錠	
7歳未満	服用しないこと	


- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。本剤はとくに吸湿しやすい製剤なので服用のつど、ビンのカップをしっかりと閉めてください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)一度開封した後は、品質保持のため開封日より6カ月を目安になるべくすみやかに服用してください。



55日分
330錠



1日6錠で
2000mg

しみ、そばかす、日焼けによる色素沈着

第3類医薬品