

第3類医薬品

リボフラビン配合 ビタミンC錠オール・Ca ビタミンC主薬製剤

ご使用前に、この外箱を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

〔特徴〕

リボフラビン(ビタミンB2)を配合したビタミンC主薬製剤です。
6錠(15歳以上の1日最大服用量)中にビタミンC2000mgを含みます。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県岡崎市東園田町2丁目106番地


本品に関するお問い合わせ
くすり相談室：TEL(06)6491-6222
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



しみ、そばかす 第3類医薬品 日焼けによる色素沈着 アスコルビン酸カルシウム配合



1日6錠で
2000mg



ナトリウムフリー

55日分
330錠

〔用法・用量〕

下記の量を食後、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2回
11歳以上 15歳未満	1～2錠	
7歳以上 11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

ビタミンC錠オール・Caは錠剤で、1日量(6錠)中に次の成分を配合しています。

アスコルビン酸……………1,400.0mg

アスコルビン酸カルシウム……………726.0mg

〔アスコルビン酸(ビタミンC)として…599.8mg〕

リボフラビン(ビタミンB2)……………6.0mg

添加物として、マンニトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有しています。


保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)箱の「開封年月日」記入欄に開封した日付を記入し、ビンに箱に入れたまま保管し、一度開封した後は品質保持の点から、開封日より6ヵ月以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

しみ、そばかす 第3類医薬品 日焼けによる色素沈着 アスコルビン酸カルシウム配合



1日6錠で
2000mg



ナトリウムフリー

55日分
330錠