

NOIRODAN-A

【成分・分量】

ノイロダンAは黄色の糖衣錠で、1日最大服用量(3錠)中に次の成分を配合しています。

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)
..... 109.16mg
(フルスルチアミンとして 100mg)
リボフラビン(ビタミンB2) 12.00mg
ニコチン酸アミド(ビタミンB3) 30.00mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 20.00mg
シアノコバラミン(ビタミンB12) 60μg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、CMC-Na、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含有しています。

【成分に関する注意】

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB2)によるものですので、心配ありません。



この用紙には古紙/パルプが利用されています。



290錠


ノイロダンA ビタミンB1主薬製剤

肉体疲労時のビタミンB1補給

関節痛 神経痛

の緩和に

第3類医薬品



第3類医薬品 販売名：ノイロダン A

ご使用前に、この外箱を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ピンを箱に入れたまま保管し、一度開封した後は品質保持の点から、開封日より6ヵ月以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ノイロダンA

第3類医薬品

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：
神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

次の場合のビタミンB1の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

次の量を食後すぐに水又はお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	1回
11歳以上 15歳未満	1～2錠	
7歳以上 11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

【用法及び用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造販売元 オール薬品工業株式会社

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
本品に関するお問い合わせ
くすり相談室 TEL(06)6491-6222
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00