

第②類医薬品

解熱鎮痛剤
イブプロフェン配合
ネルベンエースA錠

ネルベンエースA錠は頭痛・歯痛・生理痛などの痛みや悪寒・発熱時の解熱にすぐれた効果をあらわします。

！ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
 - (8) 次の病気にかかったことのある人：胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれに伴って息苦しき、だるさ、悪心・嘔吐、血尿、蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。(これらの症状は特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人の多くで報告されている。)
ぜんそく	

裏面もお読みください。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

【成分・分量】

6錠(大人1日量)中

成 分	分 量	主 な 作 用	
・非ピリン系 鎮痛・解熱薬	イブプロフェン	450mg	痛みをしずめ、熱をさげます。
鎮 静 薬	アリルイソプロピルアセチル尿素	180mg	解熱・鎮痛薬の効果を助けます。
カフェイン薬	無水カフェイン	240mg	頭痛緩解作用を有し、解熱・鎮痛薬及び鎮静薬と併用することにより、鎮痛効果を高めます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、マクロゴールを含有しています。

【効能・効果】


頭痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の量になるべく空腹時をさけて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	3回まで (服用間隔：4時間) (以上おくこと。)
15才未満	服用しないこと。	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 錠剤の取り出し方(シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど
思わぬ事故につながる場合があります。)



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00

製造販売元

 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地