

第②類医薬品

かげのねつ、せき エスパーロン感冒薬 — 非ピリン系 —

「かげ」にかかるると全身に倦怠感が強く現われ、お仕事や家事など日常生活に支障をきたし、さらに体力を消耗して思わぬ病気を引き起すもとともなります。

エスパーロン感冒薬は古くから「かげ」に用いられている漢方薬「香蘇散」を配合した非ピリン系のかぜ薬です。「香蘇散」をはじめ各成分が協力的に働いて、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛などの「かげの諸症状」を緩和します。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある)
4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満) (5)高齢者 (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7)次の症状のある人：高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こる場合があります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんま疹、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
ぜんそく	息をする時ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の量を食後約30分以内に服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数	年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15才以上）	1 包	3 回	3 才以上 7 才未満	1/3 包	3 回
11才以上 15才未満	2/3 包		3 才未満	使用しないこと	
7 才以上 11才未満	1/2 包				

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

3 包（成人の 1 日服用量）中

はたらき	成 分	含量
かぜによる不快なたん、せきを抑えます。	d-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg
かぜによる悪寒や発熱をおさえ、頭痛や関節、筋肉の痛みをしずめます。	エテンザミド	600mg
	アセトアミノフェン	540mg
かぜによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった諸症状を緩和します。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
かぜによる諸症状の改善を補助します。	無水カフェイン	75mg
古くから「かぜ」に用いられている漢方薬	香蘇散	2,200mg
	コウブシ末……………800mg チンピ末……………600mg ソヨウ末……………400mg カンゾウ末……………200mg ショウキョウ末……………200mg	

添加物として、カルメロースCa、ポビドン、タルク、安息香酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発 売 元

株式会社 イー・エス・ピー薬品

〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
イヤサカビル1階

お問い合わせ先

製造販売元 渡辺薬品工業株式会社

富山市水橋町555番地
TEL. 076-478-0205