

【成分・分量】1日量(50mL) 中

コウジン乾燥エキス 100mg [原生薬換算量 1000mg]、ゴオウチンキ 200μL [原生薬換算量 2mg]、インヨウカク流エキス 250μL [原生薬換算量 250mg]、オウセイ流エキス 250μL [原生薬換算量 250mg]、ローヤルゼリーチンキ 50mg [原生薬換算量 50mg]、トウキ流エキス 200μL [原生薬換算量 200mg]、サンシュユ流エキス 200μL [原生薬換算量 200mg]、ショウキョウ流エキス 200μL [原生薬換算量 200mg]、クコシ流エキス 200μL [原生薬換算量 200mg]、オウギ流エキス 300μL [原生薬換算量 300mg]、リボフラビン 2mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、無水カフェイン 50mg、タウリン 1500mg

添加物：デキストリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、アセスルファムK、スクラロース、果糖ブドウ糖液糖(アルコール 0.45mL 以下)


◎本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になる場合があります。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造番号



ギンセンコ_Z セット
第2類医薬品 50mL

ビタミン含有保健薬

△ 使用上の注意

相談すること

次の場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。◎服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹／消化器：胃部不快感◎しばらく服用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

- 滋養強壮
- 虚弱体质
- 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。
15歳未満は服用しないでください。
◎用法及び用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3.使用期限のすぎた製品は服用しないでください。
- 4.本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、変質したものではありません。よく振って服用してください。
- 5.加温・冷凍はさせてください。

製造販売元：大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町 632-1
TEL: 0744-27-3325