

記載内容をよく読んでお使い下さい。必要な時に読めるように保管してください。2012年6月改訂

樹脂蒸散殺虫剤

販売名			医薬品の区分		有効成分・容量	
パナプレートキュー			第1類医薬品		ジクロロボス	1枚中 4.8g
					塩化ビニル樹脂その他4成分	1枚中 25.2g
厚さ	幅	長さ	重量	効能又は効果		
0.7cm	6.5cm	6.0cm	30g	ハエ、蚊及びゴキブリの殺虫駆除		
性状				形状・貯蔵方法		内容量
黄色柔軟な合成樹脂の板状物で芳香がある。				不透气性フィルムで密封して貯蔵する。		1枚 3.0g
使用期限： 3年間			製造販売元： 国際衛生株式会社（東京都中央区日本橋本町4-14-7）			

用法及び用量

1. 本剤は、開封したのち、下記の要領に従い使用してください。

使用場所	対象害虫	使用量	使用法
以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域： 倉庫、畜舎、地下室	ハエ・蚊	5～7m <sup>3</sup> の容積当たり 1枚	天井または壁に吊す。 (高さ2m位に)
便所 下水槽 浄化槽		2～3m <sup>3</sup> の容積当たり 1枚	マンホール内または蓋の裏側に吊す。
ゴミ箱 厨芥箱	ハエ ゴキブリ	1～2m <sup>3</sup> の容積当たり 1枚	蓋の裏側に貼付する。
戸棚 キャビネット	ハエ、蚊 ゴキブリ		天井または壁に吊す。 容器内に吊す。

2. 同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも3m以上の間隔で吊してください。
3. 開封した本剤の有効期間は、通常 3ヶ月です。
4. 使用中、殺虫効果が低下したと思われる場合、本剤の表面に付着したゴミまたは水分等を紙や布片で拭き取ると再び効果が見られます。

使用上の注意事項

[注意—人体に使用しないこと]

【してはいけないこと】

(守らないと副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 居室（客室、事務室、教室、病室を含む）では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないでください。
2. 飲食する場所及び飲食物が露出している場所（食品倉庫など）では使用しないでください。

【相談すること】

1. 万が一、身体に異常（倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等）が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤（2-ピリジナルドキシムメチオダイド製剤）が有効であると報告されています。
2. 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
3. 表面に少量の液体が付着することがあるので、眼に入らないように注意してください。万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けてください。

【その他の注意】

1. 定められた用法及び用量を厳守してください。
2. 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用してください。
3. 愛玩動物（小鳥、魚等）の直ぐそばに吊すことは避けてください。
4. 有害であるから飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにしてください。
5. 本剤を多量に又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を着用してください。
6. 本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんと水で良く洗ってください。
7. 使用直前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておいてください。
8. 一度開封したら必ず使用するようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】

保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管してください。

【廃棄の方法】

1. 不用になった包装はプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。
2. 開封した本剤の有効期間は通常2～3ヶ月です。有効期間が過ぎ、効力がなくなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。

ジクロロボスによる副作用報告（国際衛生株式会社が厚生労働大臣へ報告）	
受診、入院等の副作用患者が発生した場合は国際衛生株式会社へ情報提供（医師の診断書又は所見）	
医薬品医療機器情報提供ホームページ	<a href="http://www.info.pmda.go.jp">http://www.info.pmda.go.jp</a>
国際衛生株式会社ホームページ	<a href="http://www.kokusaijisei.jp">http://www.kokusaijisei.jp</a>
人が立ち入る場所での使用時・平均空气中濃度	0. 0 1 3 m g / m <sup>3</sup>
ジクロロボスの空气中許容濃度 (ACGIH)	0. 1 m g / m <sup>3</sup> 以下

お客様相談窓口： 国際衛生株式会社 東京都中央区日本橋本町4-14-7

電話： 03-3667-6711（代）

時間： 平日 9:00～17:00（除く 土、日曜日、祝祭日）