

開け口

吸湿しやすいため、使用のつどチャックをしっかりとしめること

開け口

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。
使用期限(パッケージ中部に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

チャック

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

販売名:サラクチダマ

Throat lozenge

口腔咽喉薬

指定医薬部外品

効能・効果 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

成分・分量 1日量(12粒)中

セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg グリチルリチン酸二カリウム 15mg キキョウ流エキス 1200mg(キキョウ1200mgに相当) 添加物として、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、緑茶末、l-メントール、香料、ウイキョウ油を含有する

用法・用量

1粒ずつ2粒までを口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください

2時間以上の間隔をおいて使用してください

年 齢	1回量	1日使用回数
大人(15才以上)	2粒	3～6回
5才以上	2粒	
5才未満	× 使用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)吸湿しやすいため、使用のつどチャックをしっかりとしめること(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(4)かみ砕いたり、のみ込んだりしないこと

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとしめて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと(5)乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-05

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 高市製薬株式会社

〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口10



MADE IN JAPAN