

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

リポビタンゴールド[®]X

リポビタンゴールドX

第3類医薬品



【使用上の注意】

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

★肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の
栄養補給 ★滋養強壮 ★虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 1本（50mL）中

タウリン	1500mg	チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	5mg
ローヤルゼリー	200mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	3mg
ハンピチンキ	0.1mL （反鼻 20mg に相当）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	5mg
サンヤク流エキス-A	0.1mL （山薬 100mg に相当）	ニコチン酸アミド	20mg
レマネジン 855	50mg （地黄 100mg に相当）	イノシトール	50mg
		無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、ポビドン、安息香酸 Na、クエン酸、クエン酸 Na、香料、グリセリン、バニリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり 52kcal

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度
0120-149-931

大正製薬  株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——