

鎮痛消炎パップ剤 うちみ・ねんざ・肩こり・筋肉痛

タテ・ヨコ伸縮タイプ 8枚入 (12cm×8.5cm)

# 新サンツールパップ-W

新サンツールパップ-Wは、痛み、はれをおさえるパップ剤で伸縮性が高く、関節部に使用してもはがれにくい特長があります。

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の部位には使用しないで下さい。

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### ⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

#### 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

#### 成分・分量 膏体100g (1000cm<sup>2</sup>) 中

ℓ-メントール …………… 1.0g      dℓ-カンフル …………… 0.5g  
 サリチル酸グリコール …… 1.0g      トコフェール酢酸エステル …… 0.3g  
 アルニカチンキ …………… 1.0mL (原生薬0.2g相当)

添加物:ゼラチン、エドト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。  
使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

#### お客様相談窓口

東和製薬株式会社  
 ☎ (0736) 64-2567  
 時間 9:00～17:00  
 (土・日・祝日を除く)

#### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



使用期限

製造番号

発売元:株式会社コスモ薬品

製造販売元:東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地

03

