

●効能・効果●

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3ヶ月以上です。

(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。

(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

(4)定められた用法・用量を守ってください。

※患部はなるべくかかず、かきこわず前の治療がお勧めです。また、患部が汚れている場合はよく拭いてから塗布してください。

●成分・分量●100g中

ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g

パンテノール…1.0g

添加物：ベンザルコニウム塩化物、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調節剤

製造番号

使用期限



かぶれ

湿疹

虫さされ

# ピナクール ベビー液

かゆみ・虫さされに

アルコール・メントール無配合

## お肌にしみにない

## 治療薬

### 液体タイプ


### 低刺激 弱酸性

ステロイド成分は入っておりません

第3類医薬品

50mL

ご使用の際は、スポンジが破れるおそれがあるため、薬液を十分浸透させてから塗布してください。



●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってピナクールベビー液を口に入れてしまった場合

- 少量なめただけでは影響はありませんが、量が多いと眠気がある場合があります。
- 大量に(目安として5mL以上)飲み込んだときや、めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診察を受けてください。

こちら  
開けてください



かぶれ

湿疹

虫さされ

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### 【使用上の注意】

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
    - (1)医師の治療を受けている人。
    - (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
    - (3)湿潤やかぶれのひどい人。
  2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状           |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発売元

東光クリエート株式会社

東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

お客様相談室

03-3855-0101

副用被害救済制度  
電話 0120-149-931