

【みずむし・たむし用薬】

ストカイン[®]

第2類医薬品

- ◆ みずむし・たむしは、**真菌(カビ)**の一種である**白癬菌**が**皮膚**の角質層に寄生し、不快なかゆみや痛み等の症状を起こす皮膚病です。ストカインは、原因菌となる**白癬菌**や**かゆみ**等の症状に働き、みずむし・いんきんたむし・ぜにたむしを改善するために考え出された、生薬抽出エキス配合のみずむし薬です。
- ◆ ストカインのミコナゾール硝酸塩は**白癬菌**を殺菌し、ジフェンヒドラミン塩酸塩やリドカインは、患部のかゆみや痛みの症状を鎮めます。また、シコン・トウキのゴマ油抽出エキスは新しい皮膚の形成を助け、みずむし・たむしによる皮膚の損傷を改善します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 外用にのみ使用すること。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。

容器の使用方法

- 使用前に、容器の先端を上に向け、手の指で1~2度空押しして、中の空気を抜いて下さい。(暑い時期や温度の高い場所に置かれていた場合、また薬液が少なくなった場合などに、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、それを防ぐためです。)
- 使用する際は、容器を下向き又は斜めにして、患部(患部の痛みが強い場合は周辺部)に先端を軽く押し当てて薬液を出し、患部より広めに塗布した後、すり込んで下さい。(強く押し当てるとき薬液が出すぎるおそれがあります。)
- 容器の先端を使用部位からはなすと、薬液が出なくなります。
- 使用後はティッシュなどで容器の先端をふき取り、キャップをしっかりと閉めて、容器を立てた状態で保管して下さい。



※有効成分シコンの紫色は染料にも使用される色素です。くつ下などに色が付着すると落ちにくいでるので、ご注意下さい。

成分・分量

本剤100mL中

シコン.....4.7g	ゴマ油抽出エキス.....13.8g	ジフェンヒドラミン塩酸塩.....1.0g
トウキ.....4.7g		ミコナゾール硝酸塩.....1.0g

リドカイン.....2.5g

添加物としてイソプロパノール、ゴマ油、乳酸、ミリスチン酸イソプロピルを含有する。

- ・本剤は赤褐色で、特異なにおいを有する液剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤は1度以下の温度で凝固することがありますのでご注意下さい。凝固した場合はしばらく放置し、溶けてから使用して下さい。
- (6) 有効成分シコンの紫色は染料にも使用される色素です。くつ下などに色が付着すると落ちにくいでるので、ご注意下さい。

治療のポイント

- (1) 患部はいつも清潔に保つよう心がけて下さい。
- (2) 通気性を良くして患部がむれないようにして下さい。
- (3) くつ下など衣類は毎日取り替えるようにして下さい。
- (4) かゆみ等の症状がなくなっても、しばらくの間は根気よく治療を続けて下さい。

ストカインは生薬の特性を活かしたみずむし・たむし用薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく使用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の使用に際しては、ストカインのことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号