

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

たんの
からむ **せき・たん**に

スパート®去たんカプセル



- スパート去たんカプセルは、2つの去たん成分のみを配合した鎮咳去痰薬です。
- L-カルボシステインは、たんをうすめるとともに、たんの排出を促す線毛のはたらきを改善する作用があり、のどにからまる不快なたんを出しやすくします。
- プロムヘキシン塩酸塩は、気道粘膜の分泌を促進し、たんをサラサラにするはたらきがあります。のどにからむたんをスムーズに排出することにより、せきをしずめます。
- 8才のお子様から服用できます。



⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)次の症状のある人：高熱
- (5)次の診断を受けた人：肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

たん、たんのからむせき

【用法用量】

次の量を食後に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
8才以上15才未満	1カプセル	
8才未満	服用しないこと	

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分分量】


6カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	はたらき
L-カルボシステイン	750mg	気道粘液の粘度を正常化するとともに線毛のはたらきを改善し、たんを排出しやすくします。
プロムヘキシソリン塩酸塩	12mg	気道粘膜の分泌を促進させて、のどにからむたんをうすめ、排出しやすくします。

添加物としてトウモロコシデンプン、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限内に服用して下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748) 88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879