

インドメフィットT

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）
承認販売名	
製品名	インドメフィットT
製品名（読み）	インドメフィットT
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ぜんそくを起こしたことがある人。 11歳未満の小児。 次の部位には使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 目の周囲，粘膜等。 湿疹，かぶれ，傷口。 みずむし・たむし等又は化膿している患部。 連続して2週間以上使用しないこと <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 使用后，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この外袋を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること [関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤，かゆみ，はれ，ヒリヒリ感，熱感，乾燥感 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し，この外袋を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み，腰痛，関節痛，筋肉痛，腱鞘炎（手・手首の痛み），肘の痛み（テニス肘など），打撲，捻挫
効能関連注意	
用法・用量	ライナーをはがし，1日2回を限度として患部に貼ってください

	い.				
用法関連注意	<p>(1)用法及び用量を厳守してください。</p> <p>(2)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。</p> <p>(4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。</p> <p>(5)皮膚の弱い人は、同じ箇所には続けて貼らないでください。</p>				
成分分量	<p>膏体100g中(0.70m²中)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インドメタシン</td> <td>2.625g</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	インドメタシン	2.625g
成分	分量				
インドメタシン	2.625g				
添加物	流動パラフィン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリイソブチレン、ミリスチン酸イソプロピル、ジブチルヒドロキシトルエン、l-メントール				
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。</p> <p>(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。</p>				
消費者相談窓口	<p>問合せ先名：大協薬品工業株式会社</p> <p>問合せ先住所：富山市水橋畠等173</p> <p>問合せ先部署：お客様相談窓口</p> <p>問合せ先TEL：076-479-1313</p> <p>問合せ先受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)</p>				
製造販売会社	大協薬品工業株式会社 添付文書情報 939-3521 富山県富山市水橋畠等173				
販売会社					
剤形	貼付剤				
リスク区分等	第2類医薬品				