

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及びチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

外用薬


**アットノン** **コンシーラー**  
タイプ

販売名:アットノンt  
非ステロイド剤

## 特徴

傷あととは、傷ができたあと傷口を修復する時に皮ふ組織が異常に増殖することでできる赤み(つっぱり)などやもり上がり(しこり)のことです

1. 有効成分ヘパリン類似物質の3つのはたらき(①血行促進作用②抗炎症作用③水分保持作用)により傷あとを改善していきます



### ① 血行促進作用

血流の循環を良くして、皮ふの新陳代謝を促進します

### ② 抗炎症作用

皮ふの炎症を鎮めて、皮ふ自体の正常化機能を回復させます

### ③ 水分保持作用

角質に水分を保持させ、柔軟性を取り戻します

2. 傷あとを隠せる肌色タイプのクリームなので、外出時にもおすすめです

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人 (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)
2. 次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)

## 👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

## 効能・効果

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください

<用法・用量に関連する注意>

(1)使用のつどキャップをしっかりとめること(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目に入らないように注意すること  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4)外用にのみ使用すること●出血のある傷口には使用しないこと(血が止まりにくくなることがある)●かさぶたには使用しないこと

## 成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、水分保持作用がある

添加物として、セトステアリルアルコール、ペヘニルアルコール、ヘキシルデカノール、マイクロクリスタリンワックス、酸化チタン、カオリン、タルク、ベントナイト、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、D-ソルビトール、メタリン酸Na、パラベン、エデト酸Na、酸化鉄、三酸化鉄、pH調節剤、その他1成分を含有する  
●本剤は添加物の性質により、配合成分の一部が液体となることがありますが、効能・効果等に影響はありません

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)  
**0120-5884-01**  
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3  
MADE IN JAPAN 10175145