



をカタチにする

### 特 徴

- アルコールなどによる頭痛、二日酔に効く漢方処方“五苓散”です。
- アルコールの分解促進と、体内の水分バランス調整により、つらい頭痛や二日酔を抑えます。
- 薬早く溶ける顆粒タイプです。



1回1包

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

販売名：アルピタン

第2類医薬品

Medicine for Hangover and Headache

△使用上の注意 ㊟相談すること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要などに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたり)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しづり腹注)のものには使用しないこと、暑気あたり、むくみ、頭痛、二日酔注)「しづり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社 MADE IN JAPAN  
〒544-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)



漢方製剤

【用法・用量】大人(15才以上)1回1包、7才以上15才未満1回2/3包、4才以上7才未満1回1/2包、2才以上4才未満1回1/3包、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(2才未満は服用しないこと)【用法・用量に関連する注意】(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことを行います【成分・分量】1日量(3包:4.5g)中 五苓散エキス……2.3g【タケツキ……5.0g、チロリン……3.0g、ブドウ糖……3.0g、ビヤクジュツ……3.0g、ケイヒ……2.0g(より抽出)】添加物としてヒドロキシソルビトールセルロース、乳糖を含有する●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります