

販売名：ポラルD3000AX

第3類医薬品

【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感  
2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。

【効能】

○滋養強壮○虚弱体質  
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給



## 滋養強壮 肉体疲労時の栄養補給に

### タウリン

# 3000mg

POLAR D3000AX

タウリン、イノシトール、カルニチン塩化物  
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム

第3類医薬品 100mL

企画元：株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

【成分・分量】100mL中

タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、イノシトール100mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド20mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.2mL以下)

添加物：カラメル、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、バラベン、アルコール、香料、ミツロウ、エチルパニリン、グリセリン、プロピレングリコール、パニリン、トコフェロール

○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色くなることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶、 金属：キャップ

お客様相談室 電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用  
期限  
製造  
番号

