

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

サーボン胃腸薬顆粒

第3類医薬品

胃腸薬

サーボン胃腸薬顆粒の特徴

- 2種類の消化剤により食べ物の消化を助けます。
- ウコンをはじめ5種類の生薬が胃もたれ・胸やけを和らげます。
- 制酸薬(ナトリウムフリー)の働きで胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果]

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、胃酸過多、胃部不快感、胃重、げっぷ(おくび)、胃痛。

[用法・用量]

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回 食後に服用してください。
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満の乳幼児	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面も必ずお読みください

[成分・分量]

3包(3600mg)中

成分	分量(3包中)	はたらき
ウコン末	600mg	唾液や胃液などの消化液の分泌を促します。また、肝機能を助けます。
ショウキョウ末	90mg	芳香性健胃薬で、食欲増進作用や新陳代謝を促進します。
ケイヒ末	90mg	芳香性健胃薬で、胃腸の機能を整えます。体を温める作用もあります。
ゲンチアナ末	120mg	苦味健胃薬で、消化機能を助け、食欲不振を改善します。
チョウジ末	45mg	芳香性健胃薬で、消化機能を促進します。
ジアスターゼ	120mg	でんぷんやタンパク質の消化を助けます。
リパーゼ	45mg	脂肪の消化を助けます。
沈降炭酸カルシウム	990mg	制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。

添加物として、乳糖水和物、精製白糖、ポビドン、ケイ酸カルシウム、L-メントールを含みます。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

この商品をお使いになってのご意見、ご要望または
ご不満な点などをお聞かせいただけませんか？

 **0120-415-688**

受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1