

## ノーリツIDハップ

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）
承認販売名	
製品名	ノーリツIDハップ
製品名（読み）	ノーリツIDハップ
製品の特徴	
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b> （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は使用しないでください           <ol style="list-style-type: none"> <li>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>ぜんそくを起こしたことがある人。</li> <li>11歳未満の小児。</li> </ol> </li> <li>次の部位には使用しないでください           <ol style="list-style-type: none"> <li>目の周囲、粘膜等。</li> <li>湿疹、かぶれ、傷口。</li> <li>みずむし・たむし等又は化膿している患部。</li> </ol> </li> <li>連続して2週間以上使用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください           <ol style="list-style-type: none"> <li>医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> </ol> </li> <li>使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol> <p>[関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol>
効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

効能関連注意										
用法・用量	膏面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。									
用法関連注意	<p>(1) 用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。</p> <p>(4) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。</p> <p>(5) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。</p> <p>(6) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。</p> <p>(7) 貼付後、はがす際まれに粘着シートと膏体部分が分離する場合がありますが、効果に影響はありません。</p>									
成分分量	<p>膏体100g中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インドメタシン</td> <td>0.375g</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(1枚11.8×7.5cm<sup>2</sup>)</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	インドメタシン	0.375g				(1枚11.8×7.5cm <sup>2</sup> )
成分	分量	内訳								
インドメタシン	0.375g									
		(1枚11.8×7.5cm <sup>2</sup> )								
添加物	D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、トメントール、ポリソルベート80、pH調節剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ソルビタン、黄色205号、青色1号									
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4) 開封後は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。</p> <p>(5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。</p>									
消費者相談窓口	<p>会社名：常盤薬品工業株式会社</p> <p>問い合わせ先：お客さま相談室</p> <p>電話：0120-875-710</p> <p>受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>									
製造販売会社	<p>大協薬品工業（株） <a href="#">添付文書情報</a></p> <p>会社名：大協薬品工業株式会社</p> <p>住所：富山市水橋畠等173</p>									
販売会社	常盤薬品工業株式会社 <a href="#">添付文書情報</a>									
剤形	貼付剤									
リスク区分等	第2類医薬品									