

チルコール® 溶かして飲むかぜ薬

チルコール® 溶かして飲むかぜ薬はお湯又は水に溶かして飲むタイプの服用しやすい、しょうが味の総合かぜ薬です。

解熱鎮痛効果のあるアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤、せきをしずめる2種の鎮咳成分、発熱で失われやすいビタミンC、去痰作用のあるカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。ノンカフェイン処方です。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
(3) 15才未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがある)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症状
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

腎障害	発熱，発疹，尿量の減少，全身のむくみ，全身のだるさ，関節痛（節々が痛む），下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ，息苦しさ等があらわれる

- 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘，口のかわき，眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒（発熱によるさむけ），発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を約100mLのお湯又は水に溶かして，食後なるべく30分以内に服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください
- お湯に溶かして服用する場合は，やけどに気をつけてください
- 本剤は，服用直前にお湯又は水に溶かして服用してください。また，何回分かをまとめて溶かし，保存するようなことはしないでください

成分・分量

成人1日量（3包）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	かぜに伴う熱を下げ，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛みをやわらげます
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5mg	鼻水，鼻づまり，くしゃみをおさえます
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをおさえます
dℓ-メチルエフェドリン 塩酸塩	60mg	せきをしずめ，たんを出しやすくします
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンCの補給
カンゾウ乾燥エキス	70mg (原生薬として500mg)	たんの切れをよくします
ショウキョウ乾燥エキス	50mg (原生薬として300mg)	発汗を促し，かぜの回復を助けます

添加物としてアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物），白糖，D-ソルビトール，ポビドン，メタケイ酸アルミン酸マグネシウム，香料を含有しています

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 本剤は吸湿しやすい製剤です。1包を開封後は速やかに服用してください。また，開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問合せ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9:00 から午後5:00まで（土，日，祝日を除く）