

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2017年3月作成

虫さされ・かゆみに

第2類医薬品

ウインブルダンPCジェルX^{テン}

鎮痒消炎薬



管理コード
512022C3

ウインブルダンPCジェルXの特徴

○本剤は、10成分のはたらきで、虫さされ、かゆみなどにすぐれた効果を発揮する、ジェルタイプのお薬です。

○プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (PVA)は、「アンテドラッグ」のステロイド剤で、湿疹や皮膚炎等の炎症を鎮めます。

「アンテドラッグ」とは？……皮膚表面の患部で抗炎症作用を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。そのため、ステロイド特有の副作用を起こしにくい特性をもっています。



使用上の注意



してはいけないこと

く守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

虫さされ	かゆみ	かぶれ、湿疹	あせも

裏面も必ずお読みください

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

※擦り込むように塗ると、ジェルが固まり肌から剥がれることがありますので、薄くのばし肌のにせるように塗布してください。

また、本剤の特性上、塗布したジェルが透明な膜状となることがありますが、配合されている原料由来のもので、薬剤の有効性、安全性には影響ございません。

〈チューブ穴の開け方〉



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

成分・分量

成分	含量 (100g中)	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (PVA)	0.15g	湿疹・皮ふ炎等のはれ・赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
クロタミトン	5.0g	湿疹、虫さされなどに伴うかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.2g	炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
<i>d</i> -カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
<i>l</i> -メントール	3.5g	
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、患部の回復を早めます。
パンテノール	1.0g	お肌の正常なはたらきを助けます。

添加物：1,3-ブチレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸Na、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒプロメロース、イソプロパノール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168