服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

しみ、そばかす、日やけに

ビボナールホワイト

第3類医薬品

―― L－システイン 240mg・ビタミンC 1,000mg（成人1日量）、B_2、B_6、E 配合 ――

本剤配合のL－システイン、ビタミンCが協力して、メラニンの生成をおさえ、肌細胞の代謝を促進します。ビタミンB_2、B_6が皮膚、脂質に作用し、ビタミンEと共に肌あれ、しみ、そばかす、にきびなどの症状を緩和、皮膚機能は勿論、歯ぐきからの出血を予防します。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（1）服用後、皮膚部に発疹・発赤、かゆみ、消化器に吐き気・嘔吐などの症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、相談してください。

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

2. 服用後、下痢症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●成分・分量　6錠（成人1日量）中

L－システイン……240mg	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）……12mg
アスコルビン酸（ビタミンC）‥1,000mg	コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）……50mg
リボフラビン（ビタミンB_2）……6mg	

添加物として、セルロース、カルメロースカルシウム、トウモロコシデンプン、ケイ酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタンを含有します。

●用法・用量

成人（15歳以上）……1回2錠　　7歳以上15歳未満……1回1錠

1日3回 食前または食後に服用してください。
小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
（2）小児の手のとどかない所に保管してください。
（3）誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
（4）外箱に表示した使用期限内に服用してください。

米田薬品工業株式会社
製造販売元　奈良県高市郡高取町市尾986

本品について
のお問合せ先　お客様相談室　TEL0744-52-3720
月～金曜日　10:00～16:00（祝祭日、特定日を除く）
副作用被害救済制度　TEL0120-149-931

1407C