

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 **7枚入**
ロキソニンSテープ (7枚×1袋)

使用前にこの箱の説明文書を必ず
お読み下さい。また、必要時に
読めるよう大切に保管して下さい。

特
徴

製品情報 ▼
Product Info



すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を配合。

肌から吸収されると活性型に変化、
つらい痛みのおもで直接浸透して
しっかり効く。

1日1回使用。貼り心地がよく、
すぐれた伸縮性ではがれにくく、
貼りなおしやすい。



使用上の注意

× してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用
してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) じしん、かぶれ、傷口
 - (3) あずむし、たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けて下さい)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の診療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者
 - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があり
ますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、 水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は
直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれた場合は、使用を中止し、この
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止
し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。(他の疾患の可能性があり)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、時の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。
(用法・用量に関連する注意) (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 本剤は、痛み
やはれ等の原因になるのを病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状
のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3) 1日あたり
4枚を超えて使用しないで下さい。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、
よく拭きとってから使用して下さい。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の
皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を皮安として半日以上貼り、発疹・発赤、
かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	5.67g (無水和物として5g)	炎症や痛みのもと【プロスタ グランジン】をおさえます。

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロッコポリマー、ポリイン
ブテン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、トメントール、流動パラ
フィン、その他2成分 [1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して
下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の
容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が
変わります) (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、
袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。(5) 表示
の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、アルミ
袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元 08 登録商標
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
リードケミカル株式会社
富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN

