

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要などきに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

眼精疲労、腰痛・肩こり、肉体疲労に

ビタミンB1・B6・B12 製剤

ビタタイムFXプラスα

特徴

ビタタイムFXプラスαは、ビタミンB1誘導体のフルスルチアミン塩酸塩、ビタミンB6、ビタミンB12を配合したビタミンB1・B6・B12製剤です。

末梢血行を改善するビタミンEに、エネルギーの産生を助けるパントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、自律神経の働きを助けるガンマーオリザノールも配合し、目を酷使する現代人に起こりがちな眼精疲労や腰痛・肩こりの緩和にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢、便秘

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

●次の諸症状の緩和:

神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

●次の場合のビタミンB1 B6 B12の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



▼裏面もお読みください

用法・用量

次の1回量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|------------|------|
| 成人(15才以上) | 2～3錠 | 1日1回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3錠中

| はたらき | 成分 | 分量 |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| エネルギーの産生に重要な成分で神経や筋肉の機能を保つ働きがあります | フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体) (フルスルチアミンとして) | 109.16mg 100mg) |
| 神経系を正常に働かせます | ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) | 100mg |
| 末梢神経の機能を正常に保つ働きがあります | シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂) | 1,500μg |
| 末梢血行を改善し、肩こり・腰痛、手足のしびれを緩和します | ビタミンEコハク酸エステル カルシウム (dl-α-トコフェロールコハク酸 エステルとして) | 103.58mg 100mg) |
| 筋肉や神経組織に必要なエネルギーの産生を促します | ニコチン酸アミド | 60mg |
| ビタミンの一種でエネルギー産生に働きます | パントテン酸カルシウム | 30mg |
| 自律神経の働きを助けます | ガンマーオリザノール | 10mg |

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、乳酸Ca、ケイ酸Ca、カルメロースCa、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、酸化チタン、白糖、カルナウバロウ、リボフラビンリン酸エステルNa

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の話め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にピンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411

受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2