

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

便秘用坐薬

オイレスA

日本薬局方 ビサコジル坐剤

第2類医薬品

- オイレスAは有効成分（ビサコジル）が直腸内で直接作用します。
- 便意があらわれても、1～3分ぐらいがまんしてから排便してください。
- 小さな坐薬なので違和感なく挿入できます。



使用上の注意



してはいけないこと

連用しないこと

（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
- (3) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある

肛門部の刺激感、腹部不快感、腹痛

【効能・効果】


便秘

【用法・用量】

12歳以上1回1個を直腸内に挿入し、それで効果のみられない場合は、さらにもう1個を挿入してください。

ただし、1日2個を限度としてください。

12歳未満は使用しないでください。



〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 早くて5分程度で効果が現われる場合があるので注意すること。
- (4) 12歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (6) 肛門にのみ使用すること。

【成分・分量】 1個 (1g) 中

成 分	分量	は た ら き
ピサコジル	10mg	排便促進作用

添加物：ハードファット

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所 (1~30℃) に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 右図のように坐剤の先端を下に向けて保管すること (軟化しても坐剤の変形を防ぐことができる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また開封後は使用期限内であってなるべく速やかに使用すること。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記をお願いいたします。

大木製薬株式会社 お客様相談室

電話 03-3256-5051

受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元
大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931