

40g

かかと・足裏 水虫治療

クリーム

殺真菌

(テルビナフィン塩酸塩)

1回1回で
効く

尿素
10%

2種の
かゆみ
止め成分

抗炎症
成分

アト-ル
水虫プラスHT10クリーム

第2類医薬品

せっけんの香り

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください
(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。(6)外用にのみ使用してください。

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。(5)容器を横倒して放置すると中のクリームがキャップ側に偏るのでご注意ください。

【成分・分量】 1g中

テルビナフィン塩酸塩・・・10mg
尿素・・・・・・・・・・・・・・100mg
リドカイン・・・・・・・・・・・・20mg
ジフェンヒドラミン・・・・・・10mg
グリチルレチン酸・・・・・・・・1mg

添加物：ベヘン酸、ベヘニルアルコール、セタノール、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、パラベン、ジメチルポリシロキサン、グリシン、DL-アラニン、クエン酸Na水和物、エドト酸Na水和物、pH調節剤、香料

ここから
開けてください

アト-ル 水虫プラスHT10

クリーム

第2類医薬品

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー一症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
2.次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

規心 監製
審 監
審 監

【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)乳幼児。(3)薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。(4)患部が顔面または広範囲の人。(5)患部が化膿している人。(6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」か「はっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)。(7)妊婦または妊娠している可能性のある人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケやアカのように皮ふが剥かれる)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*全身に発現することがあります。

3.2週間位使用しても症状がよくなりえない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください



紙 税 控除 対象

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
0120-86-8998

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931