

鎮咳去痰薬

コルゲンコーッセき止め液 PLUS

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- ③ 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ④ 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、尿尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量*

下記の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。
また、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	15歳以上	12歳以上15歳未満	12歳未満
1回量	 10mL	 6mL	 服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>*

- ① 用法・用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(60mL中)

ジヒドロコデインリン酸塩……………30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………75mg
グアイフェネシン……………300mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………6mg
無水カフェイン……………120mg
バクモンドウ流エキス……………1.25mL(バクモンドウとして1.25g)
〔添加物〕クエン酸、クエン酸Na、白糖、カラメル、安息香酸、パラベン、プロピレングリコール、香料、
l-メントール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 服用のつど、ビンの口の周囲をよくふいてからキャップをしっかりしめてください。
- ⑤ 本剤に添加されている甘味成分がキャップに付着しやすいため、キャップが開かなくなる場合がありますが、この様な場合は一度キャップ部を温湯に浸してから開けるようにしてください。
- ⑥ 計量カップは、使用のつど水洗いなどして、常に清潔に保管してください。
- ⑦ 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



発売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



製造販売元

大昭製薬株式会社

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168