



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

第②類医薬品

# ムヒのこどもかぜ顆粒a

総合かぜ薬



©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

販売名:ムヒのこどもかぜ顆粒a

ムヒのこどもかぜ顆粒aは、鼻みず、せき、たん、発熱などのかぜの諸症状に効果のある成分を配合したお子さま用の総合かぜ薬です。

## 特長

- お子さま好みの「イチゴ味」の顆粒剤です。
- 苦みをなくすW(ダブル)コーティング製法採用により、飲みやすくなっています。
- 1才から11才未満のお子さま用として開発した総合かぜ薬です。
- 保存・携帯に便利な個包装です。



## 使用上の注意

本剤は小児用ですが、総合かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。)

### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。

### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

### 4. 服用前後は飲酒しないでください

### 5. 長期連用しないでください

## 相談すること



### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                       | 症 状                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                          | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死融解症<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する |

(裏面につづく)



| 症状の名称   | 症 状                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる                  |
| 腎 障 害   | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる                    |
| 間質性肺炎   | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする |
| ぜんそく    | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる                                  |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる  |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる                                            |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気。
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

| 年 齢       | 1回量                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7才以上11才未満 | 1 包    |
| 3才以上7才未満  | 2/3 包  |
| 1才以上3才未満  | 1/2 包  |
| 1才未満      | 服用しないこと                                                                                 |

1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させていただきます。

## 成分とそのはたらき

有効成分 1日量 3包(4.5g)中

| 成 分                | 分量     | は た ら き                   |
|--------------------|--------|---------------------------|
| アセトアミノフェン          | 450mg  | 熱を下げ、痛みをしずめます。            |
| d-グルコルフエニラミンマレイン酸塩 | 1.75mg | くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状をおさえます。 |
| チペピジンヒベンズ酸塩        | 37.5mg | せきをしずめ、たんを出しやすくします。       |
| dI-メチルエフェドリン塩酸塩    | 30mg   | 気管支を広げ呼吸を楽にして、せきをしずめます。   |

添加物としてエチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸Na、トリアセチン、D-マンニトール、セルロース、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、アルファ化デンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、タウマチン、ビタミンB<sub>2</sub>、香料を含有します。

**本剤に卵、牛乳由来の成分は配合されていません**

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りは、袋の口を2度折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9：00～17：00)

発売元 **muhi** 株式会社 池田模範堂 製造販売元 **TS** テイカ製薬株式会社  
富山県中新川郡上市町神田16番地 富山県富山市荒川一丁目3番27号