

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

せき、たんを ノスポール 鎮咳顆粒

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

ノスポール鎮咳顆粒は、せきをしずめる成分、たんを出しやすくする成分を効果的に配合したおくすりです、サーッと溶けて服用しやすい顆粒剤です。

⚠ 使用上のご注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

12才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

年齢区分	15才以上	12～14才	12才未満
1回量			服用しないでください
	1包	2/3包	

上記1回量を、1日3回食後に服用してください。

服用間隔は、4時間以上おいてください。

- 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 用法・用量をお守りください。
- 12才未満の小児には服用させないでください。

成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1g

成分	分量	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	中枢神経に作用してせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げる作用があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	アレルギーによるせきに効果があります。

添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、バレイシヨデンプン、サッカリンNa水和物、香料を含有します。

保管・取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 株式会社 **廣昌堂**
富山県射水市水戸田2841