

-----<切り取り線>-----



チャック

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。

消炎鎮痛インドメタシン貼付剤

松ヨードジカルプラスカーポル

第2類医薬品

肩・腰・関節などの痛みに

直接浸透

7枚入
(1枚サイズ:10cm×14cm)

【特 徴】

- 有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮めます。
- 高粘着基剤と伸縮性基布で、関節部位にもピッタリフィットします。
- 分割ライナー採用で貼りやすく、角が丸くて剥がれにくい構造です。

発 売 元
テイコクファルマシア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

-----<切り取り線>-----

第2類医薬品

販売名：オムニードジェルプラスター ID<L>

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないこと

▢ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付すること。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm 角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (5) 連続して2週間以上使用しないこと。

【成分・分量】

膏体 100g 中 インドメタシン 1.0g
添加物として、I-メントール、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

<お問い合わせ先>
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931



印
物
理
販
使
用
期
限
(年
月
西)