

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。又、
必要な時に読めるように大切に保管してください。

うおの目・たこ・いぽ用薬 第2類医薬品



スピールジェルTMは、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した角質はく離剤です。速やかに乾燥して薄い被膜をつくり、うおの目、たこ、いぽの角質を取り去ります。ジェルタイプなので液だれしにくく、患部にピンポイントで簡単に塗れます。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

●お問い合わせ先 お客様相談室 TEL:0120-377218
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

☒ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。
①目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面(首の周り等)、顔面等
(角質溶解作用の強い薬剤なので、このような部位には使用しないこと)
②炎症又はキズ、化膿のある患部等
(炎症やキズ、化膿のある患部等に使用すると刺激が強く、症状を悪化させることができます)
③群生したいぽ、身体に多発したいぽ
④みずいぽ
⑤湿ったいぽ
⑥外陰部や肛門周囲にできたふよぶよしたいぽ
⑦褐色か淡黒色の扁平に隆起した老人性いぽ
⑧かきキズにそって一列にできた若年性扁平いぽ

【効能・効果】

うおの目、たこ、いぽ

【用法・用量】

1日数回、患部に適量を塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本品は外用のみに使用し内服しないでください。
- (4)本品が患部の周りの健康な皮ふに付くと、その部分も白く軟化し、痛んだりしますので、患部の周りの皮ふに付かないようよく注意して使用してください。

⚠ 使用上の注意

█ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①乳幼児

(乳幼児においては皮ふが弱く注意が必要です)

②本人又は家族がアレルギー体質の人

③今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば

発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

④妊娠又は妊娠していると思われる人

(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を

起こす作用が報告されています)

⑤糖尿病の治療を受けている人

(糖尿病の方は感染抵抗力が低下しています。角質を取る際に皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)

(5)本品は軟膏ではありませんので、指で塗り広げてのご使用はさけてください。

【成分(100g中)】サリチル酸 15g

添加物として、ビロキシリソ、エタノール、コロジオン用ジエチルエーテル、だいだい色205号を含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)本品は揮発性ですので、使用後はノズルの口についた薬剤をよくふきとてからキャップをしっかりと締めて、直射日光及び高温多湿を避け、涼しい所に保管してください。
- (3)患部以外の皮ふに付いた場合は、すぐにふきとり、衣服に付いた場合は、ぬるま湯でもみほぐすかクリーニング店に相談してください。

2. 本品が有効ない場合は、角質化された表面のざらざらした硬いいぼです。他のいぼについては専門医に相談してください。

3. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

4. 長期間使用しても症状の改善が見られない場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【その他の注意】

目に入らないように注意してください。万一目にに入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(5)本品は引火性ですので火気にはづけないでください。

(6)家具、床、身の回りの物等に付着すると、腐食や変形、変色等を起こすことがありますので、注意してください。

(7)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

スピールジェルTM 3g
保護用パッド 9枚

※同封の保護用パッドが不足した場合は、「スピールガードTM」
又は「スピールTM抗菌パッド」を別途お買い求めください。