

〈鎮痒消炎薬〉  
非ステロイド剤

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

(販売名) フェミルテクリーム



●4つの有効成分のはたらきにより、下記の不快な症状を改善します。

- ①リドカイン → かゆみを抑える
- ②ジフェンヒドラミン塩酸塩 → かゆみを抑える
- ③トコフェロール酢酸エステル → 治癒促進
- ④イソプロピルメチルフェノール → 殺菌効果

●こんな症状にお使いください。

- ・生理時のかゆみ
- ・下着によるかゆみ、かぶれ
- ・その他の炎症、かゆみ、かぶれ
- ・おりもの、汗によるかゆみ
- ・陰部周辺のかゆみ

●ご注意

カンジダ症・トリコモナス症などによるかゆみは医師による治療が必要です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。

目の周囲、粘膜など

#### 🗉 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人
- (4) 患部の湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

裏面もお読みください。

### ■ 効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

### ■ 用法・用量


1日数回、患部に適量を塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること。
5. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。

【チューブの穴のあけ方】

キャップを逆さにして、突起部分をチューブの先に強く押し当ててください。



### ■ 成分・分量 100g中

リドカイン 2.0g : 局所麻酔作用によりかゆみを抑えます。  
ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g : 抗ヒスタミン作用でかゆみの発生を抑えます。  
トコフェロール酢酸エステル 0.3g : 新陳代謝を促し、治癒を促進します。  
イソプロピルメチルフェノール 0.1g : 殺菌効果で雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミンを含有する。

### ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。  
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること。

製造販売元 玉川衛材株式会社  
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株) TEL.03-4334-8857  
お客様相談窓口 (受付時間 10:00~17:00 土・日・祝日を除く)

フェミルテ Femilute 商品情報はこちら



KE37-SG-SP