

私の漢方薬



吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしっかりとしめること

キリトリ線

服用に際して、この説明文を必ずお読みください

第2類医薬品

販売名：八味地黄丸料錠 T07

△ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること：下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：下腰痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ

用法・用量 次の量を1日3回食前または食間に、水または白湯^{さゆ}にて服用すること

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
5歳以上15歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2～3時間を指します

<用法および用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること

2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(9錠)中

八味地黄丸エキス(1/2量)2200mg(ジオウ 2.5g, サンシュユ 1.5g, サンヤク 1.5g, タクシャ 1.5g, ブクリョウ 1.5g, ボタンビ 1.5g, ケイヒ 0.5g, ブシ末 0.5gより抽出)を含む。添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む

保管および取扱上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にぬれた手で触れないこと (6) 手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがあります。効果に差異はありません (8) 乾燥剤は服用しないこと

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
☎0120-149-931

発売元 株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ

東京都豊島区西池袋3-27-12

お問い合わせ先:0120-009-642

受付時間:9:00～17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)



SE-1

製造番号

使用期限

製 造 中村薬品工業株式会社

販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32