

生薬製剤
1.5g×24包

押して開ける

第3類医薬品

販売名:「クラシエ」オンジエクス顆粒

〈成分〉成人1日の服用量3包(1包1.5g)中
オンジエクス…53.7mg (オンジ3.0gより抽出。)
添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、CMC-Ca、
ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。
- (2)本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

〈効能〉中年期以降の物忘れの改善

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
成人(15才以上)…1回1包 15才未満は服用しないこと

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元 クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931

製造
番号

使用
期限

05018

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください