

カゼチームプロ顆粒

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	
製品名	カゼチームプロ顆粒
製品名（読み）	カゼチームプロカリュウ
製品の特徴	
使用上の注意	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる） - 次の人は服用しないこと - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 本剤又は他のかぜ薬，解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 - 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮静薬，鎮咳去痰薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等） - 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。） - 服用前後は飲酒しないこと - 長期連用しないこと ■相談すること - 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 授乳中の人。 - 高齢者。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。 高熱，排尿困難 - 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害，糖尿病，心臓病，高血圧，肝臓病，腎臓病，胃・十二指腸潰瘍，緑内障 - 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤，かゆみ

消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振
 精神神経系：めまい
 泌尿器：排尿困難
 その他：過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

〔症状の名称：症状〕

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群），中毒性表皮壊死融解症，急性汎発性発疹性膿疱症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。

薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる，全身性の発疹，発熱，体がだるい，リンパ節（首，わきの下，股の付け根等）のはれ等があらわれる。

肝機能障害：発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱，発疹，尿量の減少，全身のむくみ，全身のだるさ，関節痛（節々が痛む），下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。

ぜんそく：息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。

無顆粒球症：突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強がみられた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
 口のかわき，眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和
効能関連注意	
用法・用量	15歳以上：1回：1包 11歳以上15歳未満：1回：2／3包 7歳以上11歳未満：1回：1／2包 3歳以上7歳未満：1回：1／3包 1歳以上3歳未満：1回：1／4包 1歳未満：服用しないこと いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

用法関連注意	(1) 用法及び用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。		
成分分量	3包中		
	成分	分量	内訳
	アセトアミノフェン	900.0mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
	ノスカピン	48.0mg	
	dl-メチルエフエドリン塩酸塩	36.0mg	
	無水カフェイン	75.0mg	
	桂枝湯エキス	300.0mg	(ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各0.8g, カンゾウ0.4g, ショウキョウ0.2g)
添加物	乳糖水和物, 白糖, カルメロースカルシウム, ヒドロキシプロピルセルロース, D-マンニトール, 結晶セルロース, サッカリンナトリウム		
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。 (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。		
消費者相談窓口	会社名：大協薬品工業株式会社 お問い合わせ先：お客様相談窓口 電話：076-479-1313 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）		
製造販売会社	大協薬品工業（株） 会社名：大協薬品工業株式会社 住所：富山市水橋畠等173		
販売会社	ゲンキー株式会社		
剤形	散剤		
リスク区分等	第「2」類医薬品		