

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	カゼエースワン顆粒α
製品名	カゼエースワン顆粒α
製品名（読み）	カゼエースワンカリュウアルファ
製品の特徴	
使用上の注意	■してはいけないこと 〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕 1. 次の人は服用しないでください （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 （3）12歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気等があらわれることがあります。） 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用前後は飲酒しないでください 6. 長期連用しないでください ■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）高齢者。 （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （5）次の症状のある人。 高熱、排尿困難 （6）次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系：めまい 泌尿器：排尿困難 その他：過度の体温低下 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 〔症状の名称：症状〕 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）・中毒性表皮壊死融解症・急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 <u>薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。</u> 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																		
効能関連注意																			
用法・用量	次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。 〔年齢：1回量：1日服用回数〕 成人（15歳以上）：1包：3回 12歳以上15歳未満：2/3包：3回 12歳未満：服用しないでください																		
用法関連注意	（1）用法・用量を厳守してください。 （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。																		
成分分量	1日量（3包3.0g）中 <table> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td><td>900mg</td></tr> <tr> <td>マレイン酸カルビノキサミン</td><td>7.5mg</td></tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td></tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td><td>240mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>75mg</td></tr> <tr> <td>ベンフォチアミン（ビタミンB₁誘導体）</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB₂）</td><td>12mg</td></tr> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ 誘導体）	24mg	リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
成分	分量																		
アセトアミノフェン	900mg																		
マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg																		
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																		
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																		
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																		
無水カフェイン	75mg																		
ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ 誘導体）	24mg																		
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg																		
添加物	グリチルリチン酸2K、部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース																		
保管及び取扱い上の注意	（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 （2）小児の手のとどかない所に保管してください。 （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。） （4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 （5）使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。																		
消費者相談窓口	問合せ先名：日本薬剤株式会社 問合せ先住所：富山市東中野町一丁目1番1号 問合せ先部署：お客様相談窓口 問合せ先TEL：076-424-2239 問合せ先受付時間：月～金 9：00～17：00（祝日を除く）																		
製造販売会社	日本薬剤株式会社 添付文書情報 939-8086 富山県富山市東中野町1-1-1																		
販売会社																			
剤形	散剤																		
リスク区分等	第「2」類医薬品																		