

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



せき・たんに……

〈鎮咳去痰薬〉

第②類医薬品

アネトン® せき止め液 分包

アネトンせき止め液 分包は、いろいろな原因で起こる“せき”をしずめ“たん”の切れをよくします。

さわやかなレモンティー風味の液剤で、携帯に便利な1包飲みきりタイプです。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください

（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（1）医師の治療を受けている人。

（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。

（3）高齢者。

（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（5）次の症状のある人。

高熱、排尿困難

（6）次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症*

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制*	息切れ、息苦しさ等があらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数	症状により約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用することができます。
成人(15歳以上)	1包(10mL)	3回	
15歳未満	服用しないでください。		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 1回1包の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。
(3) 開封時および服用時には、液剤の飛び出しに注意してください。

〈服用方法〉

- ①  押印を指で押さえ、切れ目に沿って完全に切り取ってください。
②  開封口付近の両脇を、軽く持ちます。
③  液の飛び出しに注意して、そのまま服用してください。

【成分・分量】

アネトンせき止め液 分包は淡褐色澄明の液剤で、成人1日量（6包）中〈1包10mL〉の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成 分	分 量	は た ら き
コデインリン酸塩水和物 (リン酸コデイン)	50mg	せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。
セネガ流エキス	1500mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。


添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。
(5) 携帯するときは、分包が折り曲がらないようにしてください。



【包装】

アネトンせき止め液 分包：3包

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室：0120-834389（フリーダイヤル）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

株式会社パナケイア製薬

〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地

販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売提携

武田コンシューマヘルスケア株式会社