

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	
製品名	かわかみんかぜ
製品名（読み）	カワカミンカゼ
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないこと <ol style="list-style-type: none"> （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他のかぜ薬，解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 （3）12歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮静薬，鎮咳去痰薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等） 3. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。） 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること 5. 服用前後は飲酒しないこと 6. 長期連用しないこと <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）高齢者。 （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （5）次の症状のある人。 高熱，排尿困難 （6）次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害，糖尿病，心臓病，高血圧，肝臓病，腎臓病，胃・十二指腸潰瘍，緑内障，呼吸機能障害，閉塞性睡眠時無呼吸症候群，肥満症 2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔関係部位：症状〕
 皮膚：発疹・発赤，かゆみ
 消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振
 精神神経系：めまい
 泌尿器：排尿困難
 その他：過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

〔症状の名称：症状〕
 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。
 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群），中毒性表皮壊死融解症，急性汎発性発疹性膿疱症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。
 薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる，全身性の発疹，発熱，体がだるい，リンパ節（首，わきの下，股の付け根等）のはれ等があらわれる。
 肝機能障害：発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。
 腎障害：発熱，発疹，尿量の減少，全身のむくみ，全身のだるさ，関節痛（節々が痛む），下痢等があらわれる。
 間質性肺炎：階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。
 ぜんそく：息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。
 再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。
 無顆粒球症：突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。
 呼吸抑制：息切れ，息苦しさ等があらわれる。
 3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強がみられた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
 便秘，口のかわき，眠気
 4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB2）により，尿が黄色くなることがあります。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和

効能関連注意

用法・用量	いずれも、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。 15歳以上：1回：1包 12歳以上15歳未満：1回：2/3包 12歳未満：服用しないこと																						
用法関連注意	(1) 用法及び用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。																						
成分分量	3包中 <table border="1" data-bbox="544 443 1225 954"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900.0mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24.0mg</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>48.0mg</td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60.0mg</td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>240.0mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75.0mg</td> </tr> <tr> <td>チアミンジスルフィド</td> <td>24.0mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン</td> <td>12.0mg</td> </tr> <tr> <td>ゴオウ</td> <td>3.0mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900.0mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg	ノスカピン	48.0mg	dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg	無水カフェイン	75.0mg	チアミンジスルフィド	24.0mg	リボフラビン	12.0mg	ゴオウ	3.0mg
成分	分量																						
アセトアミノフェン	900.0mg																						
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																						
ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg																						
ノスカピン	48.0mg																						
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg																						
グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg																						
無水カフェイン	75.0mg																						
チアミンジスルフィド	24.0mg																						
リボフラビン	12.0mg																						
ゴオウ	3.0mg																						
添加物	バレイショデンブン、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、グリチルリチン酸二カリウム、香料																						
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。） (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。																						
消費者相談窓口	会社名：大協薬品工業株式会社 お問い合わせ先：お客様相談窓口 電話：076-479-1313 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）																						
製造販売会社	大協薬品工業（株） 会社名：大協薬品工業株式会社 住所：富山市水橋島等173																						
販売会社	河上薬品商事（株）																						
剤形	散剤																						
リスク区分等	第「2」類医薬品																						