

第2類医薬品

販売名: アトラスミン葛根湯液

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチ	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

使用期限
製造番号

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

開け口

かぜのひきはじめ
鼻かぜ、頭痛に

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1本(30mL)	1日3回
15才未満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます、よく振ってから服用してください。

【成分・分量】 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス……………4.34g
(カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャ Yak 3g、カンソウ2g、ショウキョウ1g)
添加物:アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化)、キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

第2類医薬品

満量処方

鼻かぜ

頭痛

肩こり

かぜのひきはじめ
鼻かぜ、頭痛に

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地

本社所在地

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話:058-278-3933

受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)