

この添付文書は、本剤をご使用になる前に、かならずお読みください。
またご使用になられる期間は、いつでも読めるように保管しておいてください。

骨や歯の発育促進と脆弱防止に――

グロスキュー[®]Ca

第3類医薬品

カルシウム剤 ウルソデオキシコール酸、タウリン

●2種類のカルシウム配合

溶解度が高いグルコン酸カルシウム水和物とカルシウムの含有量が高い沈降炭酸カルシウムの2種類の成分を配合しました。通常の食生活で不足しがちなカルシウムを補うことができます。

●ウルソデオキシコール酸とタウリン配合

腸管からのカルシウム吸収促進作用があるウルソデオキシコール酸とタウリンを配合しました。カルシウムが効率よく利用されます。

●小粒で、お子さまからお年を召した方まで服用しやすいカルシウム剤です。

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐・食欲不振・胃もたれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

- 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

【用法・用量】 次の1回量を1日3回、食後に服用。

年 齢	15歳以上	7歳～14歳	5歳～6歳	4歳以下
1 回 量	4錠	3錠	2錠	服用しないこと
服用回数	1日3回食後			×

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(12錠)中

成 分	分 量	は た ら き
グルコン酸カルシウム水和物	400mg	カルシウムの補給
沈降炭酸カルシウム	660mg	カルシウムの補給
ウルソデオキシコール酸	10mg	カルシウムの吸収促進
タウリン	160mg	カルシウムの吸収促進

添加物：クロレラエキス-A、白糖、乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、クエン酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、香料

【保管および取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます

クロレラ工業株式会社
東京都港区浜松町1丁目18番16号
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-819655
(受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00、土・日、祝祭日を除く)

発 売 元  **クロレラ工業株式会社**
東京都港区浜松町1丁目18番16号

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168